


Tratamiento de emergencia por sobredosis de opioides Importante:

- Para uso nasal únicamente.
- No pruebe el dispositivo de aerosol nasal antes de usarlo.
- 1 dispositivo de aerosol nasal contiene 1 dosis de medicamento.
- Cada dispositivo solo pulveriza una vez.



Información sobre el medicamento

Ingrediente activo (en cada pulverización)

Clorhidrato de naloxona 4 mg..... Tratamiento de emergencia por sobredosis de opioides

Objetivo

Usos

- para «reanimar» a alguien en caso de **sobredosis por consumo excesivo de analgésicos o drogas ilegales, como la heroína**
- este medicamento puede salvar vidas


Instrucciones



1 VERIFIQUE

Paso 1: VERIFIQUE si sospecha de una sobredosis:

- **VERIFIQUE** en caso de sospecha de sobredosis: la persona no se despierta, está muy somnolienta o no respira bien.
 - Grite «¡Despierta!».
 - Sacuda a la persona con suavidad.
 - Si la persona no está consciente, vaya al paso 2.



2 ADMINISTRE

Paso 2: Administre la primera dosis en la nariz.

- **SUJETE** el dispositivo del aerosol nasal con el pulgar en la parte inferior del émbolo.
- **INSERTE** la boquilla en cualquiera de las **fosas nasales**.
- **PRESIONE** firmemente el émbolo para administrar la primera dosis.
- 1 dispositivo de aerosol nasal contiene 1 dosis.



3 LLAME

Paso 3: Llame al 911

- **Llame al 911** de inmediato tras administrar la primera dosis



4 OBSERVE /ADMINISTRE

Paso 4: OBSERVE Y ADMINISTRE

- **Espere** 2-3 minutos después de la primera dosis para que el medicamento tenga tiempo de hacer efecto.
- Si la persona se despierta: vaya al paso 5.
- Si la persona **no se despierta**
 - **CONTINÚE ADMINISTRANDO** dosis cada 2-3 minutos hasta que la persona se despierte.
 - Es seguro seguir administrando dosis.



5 PERMANEZCA


Paso 5: PERMANEZCA

- **PERMANEZCA** hasta que llegue la ambulancia: incluso si la persona se despierta.
- **ADMINISTRE** otra dosis si la persona vuelve a tener mucho sueño.
- Es posible que tenga que administrar todas las dosis del envase.



Despliegue para ver información sobre medicamentos

Despliegue para ver información sobre medicamentos



Despliegue para ver información sobre medicamentos ▶

Información sobre el medicamento (continuación)

Advertencia

Al utilizar este producto, algunas personas pueden experimentar síntomas al despertarse, como temblores, sudoración, náuseas o sensación de enfado. Esto es normal.

Información adicional

- Almacenar a temperatura ambiente o en el refrigerador, entre 2 °C y 25 °C (36 °F y 77 °F).
- No congelar.
- Evitar el calor excesivo por encima de los 40 °C (104 °F).
- Proteger de la luz.
- El producto está envasado en ampollas selladas individualmente. No use el producto si la ampolla está abierta o rota, o si el dispositivo parece estar dañado.

Ingredientes inactivos

cloruro de benzalconio, edetato disódico, ácido clorhídrico, cloruro de sodio, agua

¿Preguntas?

Llame al 1-844-4NARCAN (1-844-462-7226) o visite www.narcan.com